

NOUVEAUX MALACHIDES EXOTIQUES DES COLLECTIONS DU MUSÉUM DE PARIS,

PAR M. MAURICE PIC.

---

**Pseudocolotes Schimperi** nov. sp.

Oblongus, subnitidus, niger, capite antice, thorace lateraliter, antennis ad basin pedibusque anticis pro parte testaceis; elytris cærulescentibus, ad medium lateraliter testaceo notatis.

Oblong, peu brillant surtout sur l'avant-corps, pubescent de gris, noir avec la majeure partie antérieure de la tête, les côtés latéraux du prothorax largement, les antennes à la base et les pattes antérieures en partie testacées, élytres bleuâtres, ornés, sur les bords latéraux, d'une macule testacée étroite, partant près de la base pour atteindre le milieu. Tête testacée, étroitement foncée postérieurement; antennes à 1<sup>er</sup> article long; prothorax transversal, rétréci postérieurement, orné d'une bande médiane noire complète; élytres de la largeur du prothorax, pas très longs, un peu élargis postérieurement, à ponctuation moyenne, assez rapprochée; pattes foncées, les antérieures testacées en dessous; cuisses antérieures un peu échancrées en dessous près du sommet.

Long. : 3 millimètres.

Abyssinie : Tigré, 1850 (Schimper).

Voisin de *P. Anceyi* Ab., en diffère par la bande noire du prothorax complète et la macule testacée des élytres non élargie.

**Pseudocolotes ruficeps** nov. sp.

Oblongus, nitidus, niger, antennis ad basin testaceis, capite rufo, elytris cærulescentibus.

Oblong, brillant, presque glabre, noir avec la tête rousse, les élytres bleuâtres et la base des antennes teintée de roux. Tête avec les yeux de la largeur du prothorax, un peu rétrécie postérieurement, impressionnée sur le front; antennes assez grêles, noires avec les premiers articles teintés de roux en dessous; prothorax transversal, arqué et relevé sur les côtés, un peu ruguleusement ponctué sur les côtés, plus brillant, finement et éparément ponctué sur le disque; élytres de la largeur du prothorax, pas très

longs, assez élargis vers le milieu, à ponctuation moyenne, peu rapprochée; pattes foncées.

Long. : 3 millim.

Abyssinie, 1882 (Raffray).

Espèce distincte entre toutes par la coloration.

**Attalus s.-g. nov. Sulcattalus.**

Antennis validis, pectinatis, thorace postice et lateraliter subtiliter sulcato, pedibus validis.

Ce sous-genre nouveau est caractérisé par les membres robustes avec les antennes pectinées, et surtout par la structure du prothorax qui offre un fin, mais très distinct, sillon arqué, longeant le bord postérieur et remontant sur les côtés presque jusqu'aux angles antérieurs.

**Attalus (Sulcattalus) Bloyeti nov. sp.**

Robustus, nitidus, pro maxima parte æneus, pro parte in thorace et ad suturam testaceo marginatus, antennis ad basin pedibusque pro parte testaceis.

Robuste, brillant, orné d'une pubescence grise avec des poils gris redressés sur les élytres, noir à reflets bronzés, bord postérieur du prothorax étroitement et milieu de la suture teintés de testacé, dessous des premiers articles des antennes et partie des pattes testacés. Tête densément ponctuée; impressionnée entre les yeux, un peu moins large que le prothorax; antennes robustes, pas très longues, articles 4 et suivants fortement dentés; prothorax transversal, rétréci et arqué postérieurement, finement ponctué; élytres courts et larges, subparallèles, à ponctuation fine et dense, bronzés avec la suture bordée de testacé sauf à la base et au sommet; pattes robustes, en majeure partie testacées.

Long. : 4,5 millim.

Afrique : Kondoia, 1885 (Bloyet).

**Hedybius limbatipennis nov. sp.**

Oblongus, nitidus, pro parte testaceus, pro parte nigro-æneus, elytris viridescens, testaceo cinctis.

Oblong, brillant, pubescent de gris avec des poils dressés, en partie testacé, en partie d'un noir bronzé, élytres verdâtres, bordés de testacé. Tête plus large que le prothorax, foncée en arrière, testacée en avant, davantage chez ♀, fortement excavée sur le vertex et tuberculée vers les

yeux ♂; antennes testacées, robustes; prothorax court et large, rétréci postérieurement, foncé avec le pourtour bordé postérieurement de testacé ♀, ou la base brièvement marquée de testacé ♂; élytres plus larges que le prothorax, courts, à ponctuation fine, assez rapprochée, verdâtres avec le pourtour et la suture bordés de testacé, la bordure élargie vers le milieu des élytres sur la suture et les côtés; pattes testacées, les postérieures étant plus ou moins foncées.

Long. : 5 millim.

Abyssinie : Tigré, 1850 (Schimper).

Voisin de *H. formosus* Reiche, mais prothorax de coloration différente, bordure des élytres moins élargie au milieu, etc.

***Apalochrus Degeorgisi* nov. sp.**

♀. Grandis, satis latus, nitidus, viridi-metallicus, labro, antennis ad basin, pedibus et abdomine pro parte testaceis, elytris testaceis, antice late et postice sinuato-fasciatis, fasciis viridi-metallicis.

Grand et assez large, brillant, orné d'une pubescence grise avec des poils obscurs dressés sur les élytres, vert métallique avec le labre, la base des antennes (extrémité des antennes et tarsi plus ou moins obscuris), les pattes et partie de l'abdomen testacés, élytres testacés avec, sur chacun, une large fascie basale subsinuée postérieurement et rapprochée des côtés sans les toucher, une fascie postmédiane très sinuée, amincie et prolongée en arrière sur les côtés, celles-ci d'un vert métallique; tête à ponctuation plus dense en avant, impressionnée sur le vertex, foncée avec le labre, l'épistome et les parties buccales testacés; antennes courtes, assez robustes; prothorax assez large, subarqué sur les côtés, sinué et un peu impressionné postérieurement, à ponctuation assez fine sur le disque, plus forte, un peu granuleuse et plus ou moins rapprochée sur les côtés; élytres assez finement, peu fortement et densément ponctués, peu plus larges que le prothorax, faiblement élargis postérieurement; pattes assez longues.

Long. : 7 millimètres.

Congo : environs de Brazzaville, 1899 (Degeorgis).

Voisin de *H. Jansonii* Pic, plus large, avec la bande postérieure verte des élytres différente, très prolongée en arrière sur les côtés.